







## Cambios en el abandono del consumo de tabaco en España, 1987-2020

**Autores:** Agustín Montes Martínez, Iñaki Galán Labaca, Mónica Pérez Ríos, Cristina Ortiz, Grupo de trabajo de Tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología

ID: 36

- **Introducción:** El objetivo de este estudio es estimar la evolución del abandono del tabaquismo en España desde 1987 hasta 2020..
- **Material y Método:** Análisis de la serie histórica de la Encuesta Nacional de Salud de España y de la Encuesta Europea de Salud en España. Se elaboraron modelos de regresión de Poisson ajustados simultáneamente por las características sociodemográficas, estimando para cada año la Proporción de Abandono (PA) y sus intervalos de confianza al 95%.
- **Resultados:** La PA aumentó desde 1987 (24,4%) hasta 2014 (50,4%), cuando se estabiliza. La diferencia absoluta entre las tasas de 2020 y 1987 fue de 18,6%. Ha sido significativamente mayor en los hombres que las mujeres desde 1993 a 2006. La diferencia absoluta en el periodo fue también superior en los hombres (19,2 % frente a 16,5%). Se observó un incremento de PA en todas las edades, pero aumentando su magnitud con la edad. Las personas con estudios universitarios mostraron una mayor PA en cada encuesta y también son las que muestran un mayor incremento absoluto en la PA en el periodo.



- **Conclusión:** La PA se ha incrementado intensamente y de forma sostenida entre 1987 y 2020, pero se detectan importantes diferencias según edad y nivel de estudios.