

Predictores de baja percepción de riesgo del consumo de tabaco en estudiantes de secundaria y bachillerato de la Ciudad de México



Ruiz Cortés Eunice y Fuentes de Iturbe Patricia

ID: 45

- **Introducción:** La baja percepción de riesgo del uso de sustancias puede contribuir a incrementar la probabilidad de su consumo. En la percepción de riesgo influyen diversos factores personales y sociales.
- **Objetivo:** identificar algunos factores que predicen la baja percepción de riesgo del uso de tabaco en una muestra de estudiantes mediante un análisis de regresión logística binaria.
- **Material y Métodos:** La muestra estuvo conformada por 1492 hombres y mujeres de 12 a 17 años, estudiantes de nivel medio en escuelas públicas y .privadas de la Ciudad de México. Se aplicó una cédula de evaluación, cuyas escalas han sido previamente validadas y utilizadas en adolescentes mexicanos (Alfaro et al., 2010; Betancourt-Ocampo et al., 2019; OMS, 2011; Pérez de la Barrera, 2012; Sánchez-Xicoténcatl et al., 2013).
- **Variables incluidas en el modelo de regresión:** Puntaje en conocimientos de efectos del tabaco; tener amigos que fuman regularmente; puntajes en habilidades de planeación a futuro, asertividad, expresión de emociones, resistencia a presión de pares, toma de decisiones y toma de responsabilidades; haber consumido tabaco alguna vez en la vida; haber consumido tabaco en últimos tres meses.
- **Resultados:** Entre las mujeres, la probabilidad de tener baja percepción de riesgo del consumo de tabaco se incrementa cuando tienen bajo puntaje en conocimientos de las consecuencias nocivas de consumir tabaco (RM 2.458), cuando consumieron tabaco en últimos tres meses (RM 2.114) y cuando tienen bajo puntaje en resistencia a presión de pares (RM 2.089). Entre los hombres, la probabilidad de tener baja percepción de riesgo del consumo de tabaco se incrementa cuando consumieron tabaco en últimos tres meses (RM 1.976) y cuando tienen bajo puntaje en resistencia a presión de pares (RM 2.164).

Predictores de baja percepción de riesgo de *fumar un cigarro de vez en cuando*

Mujeres de secundaria y bachillerato. N= 740

	B	Sig	RM	I.C. 95%	
Bajo puntaje en conocimientos de los efectos de consumir tabaco	.899	.000	2.458	1.510	4.001
Haber consumido tabaco alguna vez en los últimos tres meses	.749	.029	2.114	1.078	4.146
Bajo puntaje en resistencia a presión de pares	.736	.004	2.089	1.258	3.466

Hombres de secundaria y bachillerato. N= 752

	B	Sig	RM	I.C. 95%	
Haber consumido tabaco alguna vez en los últimos tres meses	.681	.030	1.976	1.067	3.660
Bajo puntaje en resistencia a presión de pares	.772	.005	2.164	1.266	3.697

- **Discusión y conclusiones:** Los resultados muestran la importancia de implementar acciones preventivas que aumenten la resistencia a la presión de pares y los conocimientos acerca de los efectos nocivos para incrementar la percepción de riesgo del consumo de tabaco.

➤ **Referencias:**

Alfaro, L. B., Sánchez, M. E., Andrade, P., Pérez de la Barrera, C., & Montes de Oca, P. (2010). Habilidades para la vida, consumo de tabaco y alcohol en adolescentes. *Revista Española de Drogodependencia*, 35(1), 67-77.

Betancourt-Ocampo, D., Andrade-Palos P., & Marín-Martínez, A. (2019). Análisis psicométrico de la versión revisada de la escala de fortalezas internas y externas para adolescentes (FIE-AR). *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 10(1), 20-39.

Organización Mundial de la Salud. (2011). La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) - Manual para uso en la atención primaria. Organización Panamericana de la Salud. ISBN 978-927533236-8.

Pérez de la Barrera, C. (2012). Habilidades para la vida y consumo de drogas en Adolescentes escolarizados mexicanos. *Adicciones*, 24(2), 153-160.

Sánchez-Xicoténcatl, C. O., Andrade, P., Betancourt, D., & Vital, G. (2013).

Escala de resistencia a la presión de los amigos para el consumo de alcohol. *Acta de Investigación Psicológica*, 3(1), 917-929.

Organizadores



Coorganizador

