

EVALUACION DEL USO DE LORCASERINA EN EL CONTROL DE PESO EN PROGRAMAS DE CESACION TABAQUICA EN FARMACIAS COMUNITARIAS

Autores: Rubio Rubio F. I 1 , Aguilera Escalada S 2 .(1 Farmacia Rubio en Villaverde de Guadalimar (Albacete) (2) Farmacia Aguilera en Guijo de Coria (Cáceres).

ID: 22

INTRODUCCION

La ganancia de peso en la cesación tabáquica supone una de las principales preocupaciones que abordan a aquellos individuos que se encuentran iniciados en programas de cesación tabáquica, de manera que puede ejercer un efecto disuasorio en algunos fumadores. Lorcaserina es un fármaco agonista de la serotonina con un uso autorizado en el control de peso, que además ha demostrado un efecto modesto sobre la abstinencia en el habito tabáquico.

OBJETIVOS

Evaluar la eficacia del uso de lorcaserina en la ganancia de peso y abstinencia en cesación tabáquica.

METODOS

Se realizo una búsqueda bibliográfica de lo publicado sobre el uso de lorcaserina y la ganancia de peso en cesación tabáquica.

RESULTADOS

Se encontró que la lorcaserina en combinación con parches de nicotina mostró hasta un 31% de abstinencia confirmada bioquímicamente tras 7-10 semanas en aquellos fumadores que utilizaron esta combinación en la cesación tabáquica. La tolerancia al tratamiento fue buena, y los individuos no mostraron aumento de peso, apenas 0,16 kg de media, viéndose disminuido además la sensación de disfrute sensorial del consumo de cigarrillos en estos individuos.

CONCLUSIONES

La combinación de lorcaserina y parches de nicotina ha demostrado pues, una tasa de abstinencia relativamente alta transcurridas entre 7 y 10 semanas, con una prevención optima de la ganancia de peso asociada a la cesación tabáquica, mostrando además una adherencia y tolerabilidad altas, y con efectos adversos de poca importancia.

BIBLIOGRAFIA

Rose JE, Davis JM. Combination Lorcaserin and Nicotine Patch for Smoking Cessation Without Weight Gain. *Nicotine Tob Res.* 2020;22(9):1627-1631. doi:10.1093/ntr/ntz149

